



ШКАЛА ОЦЕНКИ РИСКА ИНСУЛЬТА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ТИА ABCD2

Назначение: оценки риска инсульта после перенесенной транзиторной ишемической атаки (ТИА)

Содержание:

Характеристика	Числовое выражение
Возраст после 60 лет	1
Сахарный диабет	1
Систолическое АД > 140 мм рт.ст. или диастолическое АД > 90 мм рт.ст.	1
Продолжительность	= > 60 минут (2 балла), 10 - 59 минут (1 балл)
Нарушения речи при отсутствии других очаговых симптомов	1
Очаговая симптоматика	2

Ключ. Группы риска по шкале ABCD2: низкий риск = 0 - 3 балла; умеренный риск = 4 - 5 баллов; высокий риск = 6 - 8 баллов.

Риск инсульта в пределах 2, 7 и 90 дней после ТИА согласно категории риска ABCD2

Группа риска	Инсульт в пределах 2 дней	Инсульт в пределах 7 дней	Инсульт в пределах 90 дней
Низкий (0 - 3 балла)	1,0%	1,2%	3,1%
Умеренный (4 - 5 баллов)	4,1%	5,9%	9,8%
Высокий (6 - 8 баллов)	8,1%	12%	18%

Источник: 1. Rothwell PM, Giles MF, Flossmann E, et al. A simple score (ABCD) to identify individuals at high early risk of stroke after transient ischaemic attack. Lancet. 2005 Jul 2 - 8; 366(9479): 29 - 36. PubMed. 2. Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen-Huynh MN, et al. Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack. Lancet. 2007 Jan 27; 369(9558): 283 - 92. PubMed. 3. Chandratheva A, Mehta Z, Geraghty OC, Marquardt L, et al. Population-based study of risk and predictors of stroke in the first few hours after a TIA. Neurology. 2009 Jun 2; 72(22): 1941 - 7. PubMed.